

Ogentroost (*Euphrasia*)

ALGEMENE SLEUTEL

- schutbladen, kelken en (soms) bloemsteeltjes met klierharen; bloemkroon 7-12(-15) mm; bladschijf 6-18 mm; tanden bovenste kelkclip langer dan breed

Beklierde ogentroost

(kent 3 ondersoorten – meest voorkomende is *Euphrasia officinalis* ssp. *rostkoviana*)

- schutbladen, kelken en bloemsteeltjes zonder klierharen

+schutbladen en bladschijf met lang genaalde tanden; bloemkroon 7-10 mm


Stijve ogentroost

+ schutbladen rechtopstaand en met 3-5 spitse tanden; stengel weinig vertakt; bloemkroon 4-6 mm

Slanke ogentroost

+ schutbladen uitstaand en met 4-6 kort genaalde tanden; stengel sterk(er) vertakt; bloemkroon 5-8 mm

Bosogentroost



Beklierde ogentroost (*Euphrasia officinalis*)

Familie

helmkruidfamilie (*Scrophulariaceae*)

Diagnostische kenmerken

Plant met veel lange klierharen, tenminste op de randen van de schutbladen.

Kroonbuis sterk verlengd tijdens de bloei.

Bloemkroon ten slotte 7-12(-15) mm lang, wit, vaak met licht paarse bovenlip.

Hoogte bloeiende plant

10 - 40 cm.

Bloeitijd

Juni - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Graslanden, weiden, heiden, wegbermen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	4	4
●	1995 - ...	5	5



Stijve ogentroost (*Euphrasia stricta*)

Familie

helmkruidfamilie (*Scrophulariaceae*)

Diagnostische kenmerken

Schutbladen, kelken en bloemstelen zonder klierharen, of met schaarse korte klierharen.

Kroonbuis niet of nauwelijks verlengd tijdens de bloei.

Bloemkroon 4-11 mm lang.

Rijpe doosvrucht korter of langer dan de kelk.

Een zeer variabele (en hybridiserende) soort.



Hoogte bloeiende plant

10 – 30 (– 40) cm.

Bloeitijd

Juni - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Graslanden, rotsachtige plaatsen, droge wegen, op kalk- of niet kalkhoudende bodem.

Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	9	9
●	1995 - ...	7	7



Slanke ogentroost (*Euphrasia micrantha*)

Familie

helmkruidfamilie (*Scrophulariaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel draadvormig, niet of weinig vertakt; vertakkingen meestal in de bovenste helft van de plant.

Blad smal, tot 6(-8) mm lang, de nerven van onderen niet uitspringend.

Onderste stengelbladen met stompe tanden, de bovenste met spitsere tanden.

Schutbladen schuin afstaand, aan weerszijden met (3-)4-5 spitse of toegespitste tanden.

Bloemkroon 4-6(-7) mm lang.

Rijpe doosvrucht even lang als de kelk of langer.

Hoogte bloeiende plant

5 – 15 (– 25) cm.

Bloeitijd

Juni - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Graslanden, heiden, op niet kalkhoudende bodem.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	0	0



Geen waarnemingen in
Limburg.

Bosogentroost (*Euphrasia nemorosa*)

Familie

helmkruidfamilie (*Scrophulariaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel steviger en meestal sterk vertakt, vertakkingen meestal in de onderste helft van de plant.

Blad breed, tot 10(-12) mm lang, de

nerven van onderen iets uitspringend.

Onderste stengelbladen met iets spitse tanden, de bovenste met spitse.

Schutbladen afstaand, aan weerszijden met 4-6 spitse tot kort genaalde tanden.

Bloemkroon 5-7,5(-8) mm lang.

Rijpe doosvrucht even lang als de kelk, zelden iets korter.

Hoogte bloeiende plant

7 - 40 cm.

Bloeitijd

Juni - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Graslanden, heiden, boswegen, meestal op niet kalkhoudende bodem.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	4	4
●	1995 - ...	0	0

